



Hribul estival (*Boletus reticulatus*)



Pălăria: 5-20 cm diametru; inițial semisferică, după care devine pe o perioadă mai lungă convexă, la bătrânețe aplatizată; **brun-deschis, brun-mediu**, suprafața adesea prezintă denivelări, **păsloasă**, adesea crăpată pe vreme uscată, umedă sau la bătrânețe aderentă.



Tuburile sporifere: curbate în sus, tuburile și porii tineri la început sunt albicioși după care devin galben-verzui, la final verde-oliv.

103

104

105

108

109

125

Piciorul: 5-15 cm lungime, 2-7 cm diametru; gros, cilindric, bulbos; de culoarea alunei sau a pielii, albicioasă la bază; suprafața acoperită de o rețea fină brună, brun-pală, albicioasă.

Carnea: groasă, în tinerețe tare, la bătrânețe devine moale; albicioasă, nu i se schimbă culoarea; gust deosebit și miros plăcut.

Perioada de apariție: mai-octombrie; pe solurile acide ale pădurilor de foioase, sub stejar și fag; specie des întâlnită în anumite zone.

Valoarea alimentară: comestibilă, excelentă. Se poate usca bine.

Specii asemănătoare: specia otrăvitoare **hribul lupului**, sp. necomestibilă **fierea pădurii** (*Tylopilus felleus*), **hribul galben** (*Caloboletus radicans*), sp. comestibile **hribul murg** (*Imleria badia*), **hribul de fag** (*Boletus edulis*), **hribul arămiu** (*Boletus aereus*), *Boletus pinophilus*.



Hribul arămiu (*Boletus aereus*)

Pălăria: 5-20 cm diametru; inițial semisferică, apoi convexă, la bătrânețe aplatizată; **castaniu închis, brun-negricioasă, adesea cu pete mai deschise la culoare;** suprafața adesea prezintă denivelări, **păsloasă, cu timpul netedă,** în stare umedă sau la bătrânețe aderentă.

Tuburile sporifere: curbate în sus, tuburile și porii tineri adesea înguști la început sunt albicioși, apoi galben-verzui, la final verde-oliv.

Piciorul: 5-15 cm lungime, 2-7 cm diametru; gros, cilindric, bulbos; **brun, prevăzut îndeosebi în partea superioară de o rețea fină brună, brun-pală, albicioasă.**

Carnea: groasă, inițial tare, apoi moale; albicioasă, **nu-și schimbă culoarea;** gust și miros plăcut.

Perioada de apariție: mai-octombrie; **pe soluri acide sub stejar, fag;** specie des întâlnită

Valoarea alimentară: comestibilă, excelentă. Se usucă bine.

Specii asemănătoare: specia otrăvitoare **hribul lupului**, specia necomestibilă **fierea pădurii**, speciile comestibile **hribul murg, hribul de fag, hribul estival, Boletus pinophilus**, cu pălăria vișinie, la bătrânețe și la apăsare cu porii brun-vișinii, piciorul brun-vișiniu la bătrânețe, inițial albicios, apoi cu o păslă brună, carnea albicioasă, în special în pădurile de conifere, rar întâlnită.



102

104

105

109

125



Hribul de fag, pitoanca (*Boletus edulis*)



Pălăria: 5-40 cm diametru; la început sferică, după care se întinde; brun-închisă sau deschisă, adeseori pătată; suprafața netedă sau rugoasă, în stare umedă și la bătrânețe vâscoasă, aderentă.



Tuburile sporifere: în tinerețe cu porii înguști, se desprind ușor de pălărie; la început albicioase, când se deschid devin galben-verzui, în final oliv-verzi.



Picioarul: 5-15 cm lungime, 2-7 cm grosime; sub diferite forme, de la cilindric până la pântecos; albicios, brun-deschis; prevăzut în partea superioară cu o rețea albă.

102

103

105

108

125

Carnea: groasă, la început tare, cu timpul devine moale; albicioasă, nu se colorează, sub cuticula pălăriei roșiatică; cu gust de miez de nucă, miros plăcut.

Perioada de apariție: iunie-octombrie; îndeosebi toamna, doar pe solurile acide ale pădurilor de foioase și conifere; specie des întâlnită în anumite zone.

Valoarea alimentară: comestibilă, se păstrează bine în stare uscată.

Specii asemănătoare: specia necomestibilă hribul galben (*Caloboletus radicans*), fierea pădurii (*Tytopilus felleus*), speciile comestibile hribul murg (*Imleria badia*), hribul estival (*Boletus reticulatus*), hribul arămiu (*Boletus aereus*), *Boletus pinophilus*.



Fierea pădurii (*Tylopilus felleus*)

Pălăria: 4-15 cm diametru; la început semisferică, convexă, după care se aplatizează; de culoare **brun-deschis**, brun; mată, ușor păsloasă, catifelată, cu timpul devine goloasă.

Tuburile sporifere: curbate în sus în jurul piciorului, în tinerețe **albicioase**, după care devin **roz-carneu**, la apăsare se închid la culoare; în tinerețe porii sunt strâmți

Piciorul: 5-12 cm lungime, 1-4 cm grosime; forme variate, de cele mai multe ori cilindric, uneori măciucat, eventual pântecos; **brun-palid**; suprafața prevăzută cu o rețea cu ochiuri mari, mai închisă la culoare, brun-oliv, care uneori se întinde până la bază.

Carnea: groasă; în tinerețe mai tare, la bătrânețe mai moale; **albicioasă crem, în secțiune nu se albăstrește**, însă poate deveni ruginiu-pal; miros, nesemnificativ, gust puternic amar.

Perioada de apariție: iulie-octombrie; pe solurile foarte acide ale pădurilor de foioase și conifere; specie rar întâlnită în unele zone.

Valoarea alimentară: necomestibilă.

Specii asemănătoare: speciile comestibile **hribul murg**, (*Imleria badia*), **hribul de fag** (*Boletus edulis*), **hribul arămiu** (*Boletus aereus*), **hribul estival** (*Boletus reticulatus*), **Boletus pinophilus**, **hribul castaniu** (*Gyroporus castaneus*).



102

103

104

124

125