

LBRIS

We know
books




Alozaur

155-145 de milioane de ani în urmă

10 m • 2 t

America de Nord




Ankylosaurus

68-66 de milioane de ani în urmă

6-8 m • 5-8 t

America de Nord



Apatozaur

152-151 de milioane de ani în urmă

21-23 m • 16-20 t

1

Dinozauri



Tetanurae



Jurasic



Carnivor



LEBRIS

We know
books

Alozaurul a fost un prădător de vârf în habitatul său. Vâna în special stegozauri și brahiozauri.

Specimenele mari depășeau o înălțime de cinci metri. Craniul său era destul de mic în comparație cu restul corpului.

A fost descoperit în Colorado, S.U.A., în anul 1877. Pentru că vertebrele sale erau diferite față de ale celorlalți dinozauri găsiți până atunci, numele primit înseamnă „șopârlă diferită”.

2

Dinozauri



Ankylosauria



Cretacic



Erbivor



A fost cel mai mare **ankylosaurian** și avea corpul acoperit cu plăci osoase asemănătoare celor ale crocodilului și tatuului, numite „osteoderme”.

Era vânat de tiranozauri și de *Deinonychus*. Principala armă împotriva prădătorilor era coada sa masivă cu vârf în formă de ciocan.

A fost descoperit în Montana, S.U.A., în anul 1906. Numele său înseamnă „reptilă sudată” și face referire la plăcile osoase care îi acopereau corpul.

3

Dinozauri



Sauropoda



Jurasic



Erbivor



Acest **sauropod** a fost unul dintre cele mai mari și mai lungi animale terestre din toate timpurile. S-a crezut multă vreme că brontozaurul face parte din familia apatozaurilor.

Pentru că era atât de mare, prădătorii rar încercau să-l atace, doar adulții bolnavi și puii fiind ținte. Creierul său cântărea numai 125 de grame.

A fost descoperit în Colorado, S.U.A., în 1877. Deoarece unele dintre oasele sale seamănă cu ale reptilei acvatice *Mosasaurus*, a fost numit „șopârlă înșelătoare”.