

Gheorghe Iurea, Dorel Luchian,  
Gabriel Popa, Ioan Serdean, Adrian Zanoschi

# matematică evaluarea națională 2018

---

## clasa a VIII-a

**Memorator de matematică •**

**Teme recapitulative •**

**5 Variante de subiecte pentru luna Decembrie •**

**5 Variante de subiecte pentru luna Martie •**

**80 Variante de subiecte după modelul M.E.N. •**



# Cuprins

MEMORATOR DE MATEMATICĂ / 5

TEMES RECAPITULATIV / 23

5 VARIANTE DE SUBIECTE PENTRU LUNA DECEMBRIE / 81

5 VARIANTE DE SUBIECTE PENTRU LUNA MARTIE / 88

80 DE VARIANTE DE SUBIECTE, după modelul M.E.N. / 95

SOLUȚII / 200

## MEMORATOR DE MATEMATICĂ


### ALGEBRĂ

#### MULȚIMI NUMERICE

$\mathbb{N}$  – mulțimea numerelor naturale;  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ ,  $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ .

$\mathbb{Z}$  – mulțimea numerelor întregi;  $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ ,  $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ .

$\mathbb{Z}_+ = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\}$ ;  $\mathbb{Z}_- = \{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0\}$ .



$\mathbb{Q}$  – mulțimea numerelor raționale;  $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z} \text{ și } b \in \mathbb{Z}^* \right\}$ .

$\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ ;  $\mathbb{Q}_+ = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0\}$ ;  $\mathbb{Q}_- = \{x \in \mathbb{Q} \mid x < 0\}$ .

$\mathbb{R}$  – mulțimea numerelor reale,  $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ .

$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  = mulțimea numerelor iraționale.

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ .

#### OPERAȚII CU MULȚIMI

Reuniunea:  $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ sau } x \in B\}$ .

Intersecția:  $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ și } x \in B\}$ .

Diferența:  $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ și } x \notin B\}$ .

#### OPERAȚII CU NUMERE

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{(1+n) \cdot n}{2}, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$  (citim: „n factorial”);  $0! = 1$ .

Factor comun:  $f \cdot a \pm f \cdot b = f \cdot (a \pm b)$ ,  $\forall a, b, f \in \mathbb{R}$ .

Opusul numărului real  $r$  este numărul real  $-r$ .

Inversul numărului real nenul  $r$  este numărul real  $r^{-1} = \frac{1}{r}$ .

#### TEOREMA ÎMPĂRTIRII CU REST

În  $\mathbb{N}$ :  $\forall a, b \in \mathbb{N}$ ,  $b \neq 0$ ,  $\exists!$   $c, r \in \mathbb{N}$  astfel încât  $a = b \cdot c + r$ ,  $0 \leq r < b$ .

În  $\mathbb{Z}$ :  $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ ,  $b \neq 0$ ,  $\exists!$   $c \in \mathbb{Z}$ ,  $r \in \mathbb{N}$  astfel încât  $a = b \cdot c + r$ ,  $0 \leq r < |b|$ .

## DIVIZIBILITATE ÎN N

Pentru  $d, m \in \mathbb{N}$  spunem că  $d | m$  dacă există  $x \in \mathbb{N}$  astfel încât  $m = d \cdot x$ .

### Proprietăți:

$$P_1: 1 | n; n | 0, \forall n \in \mathbb{N};$$

$$P_2: \text{Dacă } a, d \in \mathbb{N} \text{ și } d | a, \text{ atunci } d | a \cdot n, \forall n \in \mathbb{N};$$

$$P_3: \text{Dacă } a, b, d \in \mathbb{N}, d | a \text{ și } d | b, \text{ atunci } d | (a \pm b).$$

### Criterii de divizibilitate:

I. Folosind ultima cifră a numărului:

$$2 | n \Leftrightarrow u(n) \in \{0, 2, 4, 6, 8\}; 5 | n \Leftrightarrow u(n) \in \{0, 5\}; 10 | n \Leftrightarrow u(n) = 0.$$

II. Folosind suma cifrelor numărului:

$$3 | n \Leftrightarrow 3 | S(n); 9 | n \Leftrightarrow 9 | S(n).$$

III. Folosind ultimele două cifre ale numărului:

$$4 | \overline{a...xy} \Leftrightarrow 4 | \overline{xy}; 25 | \overline{a...xy} \Leftrightarrow 25 | \overline{xy}.$$

**Număr prim:** număr natural care are exact doi divizori.

**C.m.m.d.c.:**  $d = (a, b)$  dacă: i)  $d | a$  și  $d | b$ ;

ii) dacă  $d' | a$  și  $d' | b$ , atunci  $d' | d$ .

Pentru a calcula  $(a, b)$  procedăm astfel:

- descompunem numerele  $a$  și  $b$  în factori primi;

- luăm factorii primi comuni, o singură dată, la exponentul cel mai mic și îi înmulțim.

Numerele  $a$  și  $b$  sunt relativ prime (prime între ele) dacă  $(a, b) = 1$ .

Dacă  $d = (a, b)$ , atunci  $a = dx$ ,  $b = dy$ , cu  $x, y \in \mathbb{N}$ ,  $(x, y) = 1$ .

Dacă  $n | a$  și  $n | b$ , atunci  $n | (a, b)$ .

Dacă  $a | b \cdot c$  și  $(a, b) = 1$ , atunci  $a | c$ .

**C.m.m.m.c.:**  $m = [a, b]$  dacă: i)  $a | m$  și  $b | m$ ;

ii) dacă  $a | m'$  și  $b | m'$ , atunci  $m | m'$ .

Pentru a calcula  $[a, b]$  procedăm astfel:

- descompunem numerele  $a$  și  $b$  în factori primi;

- luăm factorii primi comuni și necomuni, o singură dată, la exponentul cel mai mare și îi înmulțim.

Dacă  $a | n$  și  $b | n$ , atunci  $[a, b] | n$ .

Oricare ar fi  $a, b \in \mathbb{N}$ , are loc egalitatea  $(a, b) \cdot [a, b] = a \cdot b$ .

## PUTERI

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{\text{de } n \text{ ori}}; a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^*;$$

$$a^0 = 1, \forall a \in \mathbb{R}^*; a^1 = a, \forall a \in \mathbb{R}; 1^n = 1, \forall n \in \mathbb{N}; 0^0 \text{ nu are sens.}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a \in \mathbb{R}^*, n \in \mathbb{N}.$$

## OPERATII CU PUTERI

$$1. a^m \cdot a^n = a^{m+n}; \forall a \in \mathbb{R}^*, m, n \in \mathbb{Z}.$$

$$2. a^m : a^n = a^{m-n}; \forall a \in \mathbb{R}^*, m, n \in \mathbb{Z}.$$

$$3. (a^m)^n = a^{mn}; \forall a \in \mathbb{R}^*, m, n \in \mathbb{Z}.$$

$$4. (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n; \forall a, b \in \mathbb{R}^*, n \in \mathbb{Z}.$$

$$5. (a : b)^n = a^n : b^n, a, b \in \mathbb{R}^*, n \in \mathbb{Z}.$$

$$6. (-1)^n = \begin{cases} 1, & \text{dacă } n \text{ este număr par;} \\ -1, & \text{dacă } n \text{ este număr impar.} \end{cases}$$

## FRACTII ORDINARE, FRACTII ZECIMALE

Fracție ireductibilă:  $\frac{a}{b}$ , cu  $a, b \in \mathbb{N}$ ,  $b \neq 0$ ,  $(a, b) = 1$ .

Fracții echivalente:  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$  dacă  $a \cdot d = b \cdot c$ .

Dacă  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $b \in \mathbb{Z}^*$ , atunci  $\frac{a}{b} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow b \mid a$ .

**Transformarea fracțiilor zecimale în fracții ordinare:**

Tipul fracției zecimale	Mod de transformare	Exemplu
zecimală finită	$a, \overline{b_1 b_2 \dots b_k} = a \frac{\overline{b_1 b_2 \dots b_k}}{10^k}$	$2,79 = 2 \frac{79}{10^2} = \frac{279}{100}$
periodică simplă	$a, (\overline{b_1 b_2 \dots b_k}) = a \frac{\overline{b_1 b_2 \dots b_k}}{\underbrace{99 \dots 9}_{k \text{ ori}}}$	$13,(24) = 13 \frac{24}{99}$
periodică mixtă	$a, \overline{b_1 b_2 \dots b_k} (\overline{c_1 c_2 \dots c_p}) = a \frac{\overline{b_1 b_2 \dots b_k} - \overline{b_1 b_2 \dots b_k}}{\underbrace{99 \dots 9}_{p \text{ ori}} \underbrace{00 \dots 0}_{k \text{ ori}}}$	$3,61(754) = 3 \frac{61754 - 61}{99900}$

## MEDIA ARITMETICĂ

$$m_a = \frac{x_1 + x_2}{2}; m_a = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_k}{k}, \forall x_1, x_2, \dots, x_k \in \mathbb{R}.$$

Dacă  $p_1, p_2, \dots, p_k$  sunt respectiv ponderile numerelor  $x_1, x_2, \dots, x_k$ , atunci:

$$m_p = \frac{x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_k p_k}{p_1 + p_2 + \dots + p_k} \text{ (media aritmetică ponderată).}$$

## MODULUL UNUI NUMĂR REAL

$|x|$  – modulul (sau valoarea absolută) a unui număr real;  $|x| = \begin{cases} x, & \text{dacă } x \geq 0 \\ -x, & \text{dacă } x < 0 \end{cases}$ .

### Proprietăți ale modulului:

$$P_1: |x| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}; |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0;$$

$$P_2: |x \cdot y| = |x| \cdot |y|, \forall x, y \in \mathbb{R};$$

$$P_3: \left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}, \forall x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}^*;$$

$$P_4: |x + y| \leq |x| + |y|, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

## PARTEA ÎNTREAGĂ A UNUI NUMĂR REAL: $[x]$

$$[x] \leq x < [x] + 1; [x] \in \mathbb{Z}.$$

## PARTEA FRACTIIONARĂ A UNUI NUMĂR REAL: $\{x\}$

$$\{x\} = x - [x]; 0 \leq \{x\} < 1.$$

## RĂDĂCINA PĂTRATĂ (RADICALUL)

$$\sqrt{a} = x \Leftrightarrow x^2 = a, \text{ unde } a, x \in \mathbb{R}, a, x \geq 0.$$

## REGULI DE CALCUL CU RADICALI

- Dacă  $a \geq 0, b \geq 0$ , atunci  $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$ .
- Dacă  $a \geq 0, b > 0$ , atunci  $\sqrt{a} : \sqrt{b} = \sqrt{a:b} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ .
- $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}, a \geq 0; b \geq 0$ .
- $\sqrt{a^2} = |a|, a \in \mathbb{R}; \sqrt{a^2} = (\sqrt{a})^2 = a$ , dacă  $a \in \mathbb{R}_+$ ;  $\sqrt{a^2b} = |a|\sqrt{b}, a \in \mathbb{R}, b \geq 0$ .

## RATIONALIZAREA NUMITORULUI

- $\frac{\sqrt{b})c}{a\sqrt{b}} = \frac{c\sqrt{b}}{a \cdot b}, b > 0, a \neq 0$ .
- $\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b})c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \frac{c(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b}, \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b})c}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \frac{c(\sqrt{a}+\sqrt{b})}{a-b}, a > 0, b > 0, a \neq b$ .
- $\frac{n}{a\sqrt{b} \pm c\sqrt{d}} = \frac{n(a\sqrt{b} \mp c\sqrt{d})}{a^2 \cdot b - c^2 \cdot d}, b > 0, d > 0, a \in \mathbb{Q}^*, c \in \mathbb{Q}^* \text{ și } a^2b \neq c^2d$ .

## FORMULA RADICALILOR COMPUȘI

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a+c}{2}} \pm \sqrt{\frac{a-c}{2}}, \text{ unde } c = \sqrt{a^2 - b}$$

## INTERVALE ÎN $\mathbb{R}$

$(a; b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}; (a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\};$

$[a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}; [a; b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}.$

$[a; +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}; (a; +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\};$

$(-\infty; a) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}; (-\infty; a] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}.$

$\{x \in \mathbb{R} \mid |x| \leq a\} = [-a; a].$

$\{x \in \mathbb{R} \mid |x| \geq a\} = (-\infty; -a] \cup [a; +\infty).$

## FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT

$$1. (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

$$2. (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

$$3. (a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$$

$$4. (a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc.$$

$$5^*. (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b).$$

$$6^*. (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b).$$

$$7^*. a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2).$$

$$8^*. a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2).$$

$$9^*. 1 + a + a^2 + \dots + a^n = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1}, \forall a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, n \in \mathbb{N}^*.$$

## MEDIA GEOMETRICĂ (PROPORTIONALĂ)

$$m_g = \sqrt{a \cdot b}, a \geq 0, b \geq 0;$$

$a \leq m_g \leq m_a \leq b$ , pentru  $0 \leq a \leq b$  (inegalitatea mediilor).

## PRODUSUL CARTEZIAN

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ și } y \in B\}.$$

Dacă alegem în plan un sistem de coordonate  $xOy$ , putem identifica elementele produsului cartezian  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  cu punctele planului. Oricărei perechi ordonate de numere reale  $(x_A, y_A)$  îi corespunde un unic punct  $A(x_A, y_A)$ ;  $x_A$  se numește abscisa punctului  $A$ , iar  $y_A$  se numește ordinata punctului  $A$ .

Distanța dintre două puncte  $A(x_A, y_A)$  și  $B(x_B, y_B)$  se calculează după formula:

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}; \quad y_M = \frac{y_A + y_B}{2}.$$

## FUNCȚII

Fie  $A$  și  $B$  două mulțimi nevide. Dacă printr-un procedeu oarecare facem ca *fiecare* element din mulțimea  $A$  să-i corespundă *un singur* element din mulțimea  $B$ , atunci spunem că am definit o funcție de la  $A$  la  $B$ .

$f: A \rightarrow B$ ;  $A$  – domeniul de definiție;  $B$  – codomeniul.

Graficul unei funcții:  $G_f = \{(x, y) \in A \times B \mid f(x) = y\}$ .

$M(x, y) \in G_f \Leftrightarrow f(x) = y$ , cu  $x \in A, y \in B$ .

Funcțiile  $f: A \rightarrow B$  și  $g: C \rightarrow D$  sunt egale dacă  $A = C, B = D$  și  $f(x) = g(x), \forall x \in A$ .

## FUNCȚIA DE GRADUL I

Este o funcție  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $f(x) = ax + b$ , unde  $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$ .

Graficul unei asemenea funcții este o dreaptă oblică.

$$\begin{aligned} G_f \cap O_y &= \{A(0; b)\} \\ G_f \cap O_x &= \left\{B\left(-\frac{b}{a}; 0\right)\right\} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Punctele de intersecție ale graficului cu} \\ \text{axele de coordonate.} \end{array} \right\}$$

Dacă  $a = 0, b \neq 0 \Rightarrow f(x) = b$  (funcția este constantă); graficul este o dreaptă orizontală.

## ECUAȚIA DE GRADUL AL II-LEA

Forma generală:  $ax^2 + bx + c = 0$ , unde  $a \in \mathbb{R}^*, b, c \in \mathbb{R}$ .

Discriminantul ecuației:  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

Dacă  $\Delta > 0$ , ecuația are două soluții reale distințe:  $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ .

Dacă  $\Delta = 0$ , cele două soluții sunt egale:  $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$ .

Dacă  $\Delta < 0$ , ecuația nu are soluții reale.

Pentru  $\Delta \geq 0$ , expresia  $aX^2 + bX + c$  se descompune în factori astfel:  $a(X - x_1)(X - x_2)$ .

### UNITĂȚI DE MĂSURĂ

Unitatea de exprimare Tipul măsurătorii	Submultiplii	Unitatea principală	Multiplii
Lungime	$\text{mm}$ :10 → $\text{cm}$ :10 → $\text{dm}$ :10 → $\text{m}$ :10 → $\text{dam}$ :10 → $\text{hm}$ :10 → $\text{km}$ :10 ×10 ← $\text{mm}$ ×10 ← $\text{cm}$ ×10 ← $\text{dm}$ ×10 ← $\text{m}$ ×10 ← $\text{dam}$ ×10 ← $\text{hm}$ ×10 ← $\text{km}$	$\text{m}$	
Suprafață	$\text{mm}^2$ :10 <sup>2</sup> → $\text{cm}^2$ :10 <sup>2</sup> → $\text{dm}^2$ :10 <sup>2</sup> → $\text{m}^2$ :10 <sup>2</sup> → $\text{dam}^2$ :10 <sup>2</sup> → $\text{hm}^2$ :10 <sup>2</sup> → $\text{km}^2$ :10 <sup>2</sup> ×10 <sup>2</sup> ← $\text{mm}^2$ ×10 <sup>2</sup> ← $\text{cm}^2$ ×10 <sup>2</sup> ← $\text{dm}^2$ ×10 <sup>2</sup> ← $\text{m}^2$ ×10 <sup>2</sup> ← $\text{dam}^2$ ×10 <sup>2</sup> ← $\text{hm}^2$ ×10 <sup>2</sup> ← $\text{km}^2$	$\text{m}^2$	
Volum	$\text{mm}^3$ :10 <sup>3</sup> → $\text{cm}^3$ :10 <sup>3</sup> → $\text{dm}^3$ :10 <sup>3</sup> → $\text{m}^3$ :10 <sup>3</sup> → $\text{dam}^3$ :10 <sup>3</sup> → $\text{hm}^3$ :10 <sup>3</sup> → $\text{km}^3$ :10 <sup>3</sup> ×10 <sup>3</sup> ← $\text{mm}^3$ ×10 <sup>3</sup> ← $\text{cm}^3$ ×10 <sup>3</sup> ← $\text{dm}^3$ ×10 <sup>3</sup> ← $\text{m}^3$ ×10 <sup>3</sup> ← $\text{dam}^3$ ×10 <sup>3</sup> ← $\text{hm}^3$ ×10 <sup>3</sup> ← $\text{km}^3$	$\text{m}^3$	

Pentru suprafețe:

$$1 \text{ ha} = 100 \text{ ari} = 10000 \text{ m}^2; \quad 1 \text{ ar} = 100 \text{ m}^2.$$

Pentru capacitate, unitatea principală este litrul ( $\ell$ ).

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \ell; \quad 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}; \quad 1 \text{ m}^3 = 1000 \ell.$$

Unitatea principală pentru masă este kilogramul (kg).

$$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}; \quad 1 \text{ t} = 1000 \text{ kg}; \quad 1 \text{ q} = 100 \text{ kg}.$$

Unitatea principală pentru măsurarea timpului este secunda (s).

$$1 \text{ min} = 60 \text{ s}; \quad 1 \text{ h} = 60 \text{ min}; \quad 1 \text{ zi} = 24 \text{ h}.$$


### UNGHIUL

Unghi = reuniunea a două semidrepte închise cu aceeași origine.


Unghii se măsoară în grade, minute și secunde:  $1^\circ = 60'$ ;  $1' = 60''$ .

#### Clasificarea unghiurilor:


Unghi nul




Unghi alungit




Unghi ascuțit



Unghi drept



Unghi obtuz



$$m(\angle AOB) = 0^\circ$$

$$m(\angle AOB) = 180^\circ$$

$$m(\angle AOB) < 90^\circ$$

$$m(\angle AOB) = 90^\circ$$

$$m(\angle AOB) > 90^\circ$$

Unghiuri congruente = unghiuri care au aceeași măsură.

Bisectoarea unui unghi = semidreapta cu originea în vârful unghiului, situată în interior, care împarte unghiul în două unghiuri congruente.

Unghiuri adiacente: au același vârf, o latură comună și nu au puncte interioare comune.

Respect pentru oameni și cărți

**Unghiuri complementare:** două unghiuri care au suma măsurilor de  $90^\circ$ .

**Unghiuri suplementare:** două unghiuri care au suma măsurilor de  $180^\circ$ .


**Unghiuri opuse la vârf:** două unghiuri cu vârful comun și laturile în prelungire.

Două unghiuri opuse la vârf sunt congruente.


**Drepte paralele:** două drepte coplanare, fără puncte comune.

**Drepte perpendiculare:** două drepte concurente care formează un unghi drept.

### Unghiuri congruente formate de două drepte paralele cu o secantă:



### TRIUNGHIUL



**Notație:**  $\Delta ABC$

**Elemente:**

- vârfuri:  $A, B, C$
  - laturi:  $[AB], [BC], [AC]$
  - unghiuri:  $\angle BAC, \angle ABC, \angle BCA$
- $$m(\angle A) + m(\angle B) + m(\angle C) = 180^\circ$$

**Inegalitatea triunghiului:**

$$|AB - AC| < BC < AB + AC$$

### Clasificare:

#### I. După unghiuri

Ascuțitunghic	Dreptunghic	Obtuzunghic

#### II. După laturi

Oarecare	Isoscel	Echilateral

## TEMЕ RECAPITULATIVE

### TEMA 1. Numere naturale

#### Partea I

La fiecare dintre exercițiile de la 1 la 10 trebuie să efectuați calculele.

1.  $40 : 8 - 4 \cdot 2$ .
2.  $30 - 4 \cdot 7$ .
3.  $(253 + 147) : 25$ .
4.  $142 : (1 + 2 \cdot 35)$ .
5.  $2^3 + 3^2 - 4^0$ .
6.  $0^7 + 3^{10} : 3^8 - 9$ .
7.  $(2^5)^{12} : 2^{56} - 3^{20} : 3^{18}$ .
8.  $2 \cdot 2^3 \cdot 2^5 : 2^7 + 0^8 - 1^9$ .
9.  $25^7 : 5^{14} + 3^{90} : 27^{29}$ .
10.  $(2 + 4 + 6 + \dots + 20) - (1 + 3 + 5 + \dots + 19)$ .

11. Aflați restul împărțirii numărului 120 la 7.

12. Calculați suma tuturor numerelor naturale care, împărțite la 4, dau câtul 5 și restul nenul.

13. Calculați suma numerelor pare cuprinse între 9 și 21.

14. Aflați câte numere de forma  $\overline{ab}$  sunt impare.

15. Determinați suma numerelor prime având o singură cifră.

16. Stabiliți care dintre următoarele numere este prim: 17, 21, 29, 37, 39, 41, 51, 67, 91, 97.

17. Determinați toți divizorii naturali ai numărului 18.

18. Scrieți toți multiplii de două cifre ai numărului 13.

19. Calculați suma divizorilor naturali ai numărului 28.

20. Descompuneți în factori primi numerele: 54, 75, 120 și 300.

21. Determinați cifra  $x$ , știind că numărul  $\overline{x8x}$  se divide cu 2.

22. Determinați toate numerele de forma  $\overline{32a}$  care se divid cu 4.

23. Aflați cel mai mare număr de forma  $\overline{2c18}$  care se divide cu 3.

24. Determinați toate numerele de forma  $\overline{2x34}$  care se divid cu 9.

25. Aflați câte numere de forma  $\overline{xy6}$  se divid cu 12.

26. Determinați cel mai mare divizor comun al numerelor 36 și 48.

27. Determinați cel mai mare divizor comun al numerelor 45, 180 și 195.

28. Aflați cel mai mic multiplu comun al numerelor 6 și 8.

29. Aflați cel mai mic multiplu comun al numerelor 9, 12 și 15.

30. Determinați numărul pătratelor perfecte neneule, mai mari decât 500.

#### Partea a II-a

1. Un număr natural  $\overline{ab}$ , adunat cu suma cifrelor sale, dă 54. Aflați numărul.

2. Aflați numerele naturale  $a$  și  $b$ , știind că suma lor este egală cu 19 și că, împărțind pe  $a$  la  $b$ , obținem câtul 3 și restul 3.

3. Suma a trei numere naturale este 502. Aflați cele trei numere, știind că al doilea este triplul primului și că, împărțind pe al treilea la al doilea, obținem câtul 7 și restul 2.

4. Determinați toate numerele naturale nenule care, împărțite la 12, dau câtul de trei ori mai mic decât restul.
5. Determinați toate numerele naturale care, împărțite la un număr de două cifre, dau câtul 10 și restul 97.
6. Aflați câte numere naturale de trei cifre dau restul 7 la împărțirea cu 25.
7. Arătați că suma a trei numere naturale, care dau resturi diferite la împărțirea cu 3, este, întotdeauna, un multiplu de 3.
8. Determinați numărul  $\overline{abc}$ , știind că  $b = a + 2c$  și, împărțind pe  $\overline{abc}$  la 112, obținem câtul  $a$  și restul 59.
9. Calculați:  $2^5 - 3 \cdot [3 \cdot 7 - 2 \cdot (6^2 - 2^3) : 4] + 1^{123}$ .
10. Determinați numărul natural  $n$ , știind că  $7 \cdot 7^2 \cdot 7^3 \cdot 7^4 \cdot 7^5 = 7^{2n+1}$ .
11. Fie numerele naturale  $a = 2^{29} + 2^{40} : 2^{11}$  și  $b = 12^{20} : 2^{40}$ .
  - Arătați că  $a = 2^{30}$ .
  - Comparați numerele  $a$  și  $b$ .
12. a) Arătați că numărul natural  $a = 5 \cdot 3^{42} + 9^{20} - 10 \cdot 3^{40}$  este pătrat perfect.  
 b) Demonstrați că numărul natural  $b = 3^{42} + 2^{43}$  nu este pătrat perfect.
13. Fie  $a = 1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{10} + 3^{11}$ .
  - Arătați că  $a$  este număr par.
  - Arătați că numărul  $a$  este divizibil cu 10.
14. Demonstrați că numărul natural  $a = 2^{n+3} \cdot 7^n + 7^{n+1} \cdot 2^n - 3 \cdot 14^n$  se divide cu 12, pentru orice număr natural  $n$ .
15. Determinați toate numerele naturale  $n$  astfel încât  $2n + 1$  să dividă pe 60.
16. Determinați toate numerele naturale  $n$ , știind că  $n + 1$  divide pe  $2n + 11$ .
17. Demonstrați că, dacă  $\overline{ab} + \overline{bc} + \overline{ca} = 198$ , atunci numărul  $\overline{abc}$  este un multiplu de 9.
18. Determinați numerele prime  $p, q, r$  astfel încât  $2p + 3q + 6r = 78$ .
19. Arătați că suma a trei numere naturale consecutive  $a, a + 1$  și  $a + 2$  este număr prim doar dacă  $a = 0$ .
20. Demonstrați că, dacă  $\overline{ab} = 3 \cdot \overline{cd}$ , atunci numărul natural  $\overline{abcd}$  se divide cu 7.
21. Se consideră mulțimea  $A = \{\overline{abc} \mid a \cdot b \cdot c = 8\}$ .
  - Aflați elementele mulțimii  $A$ .
  - Stabiliti dacă mulțimea  $A$  conține numere divizibile cu 3.
22. Fie  $n$  un număr natural care împărțit la 12 și la 18 dă, de fiecare dată, câtul diferit de zero și restul 5.
  - Arătați că cel mai mic număr  $n$  cu aceste proprietăți este 41.
  - Determinați toate numerele  $n$  cu proprietățile considerate care îndeplinesc și condiția  $100 < n < 200$ .
23. Fie  $n$  un număr natural care împărțit la 20 dă restul 18 și împărțit la 15 dă restul 13.
  - Arătați că cel mai mic număr  $n$  cu aceste proprietăți este 58.
  - Stabiliti câte numere  $n$ , care îndeplinesc condițiile din enunț, sunt mai mici decât 1000.
24. a) Determinați toate numerele de două cifre  $\overline{ab}$  pentru care numărul  $\overline{ab} + \overline{ba}$  este pătrat perfect.
  - Demonstrați că nu există numere de trei cifre  $\overline{abc}$ , astfel încât numărul  $\overline{abc} + \overline{bca} + \overline{cab}$  să fie pătrat perfect.

- 25.** Determinați numerele naturale  $a$  și  $b$ , știind că  $a \geq b > 0$ ,  $a + b = 78$  și cel mai mare divizor comun al lor este 13.
- 26.** Arătați că, oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ , numărul  $a = n^3 - n$  este divizibil atât cu 2, cât și cu 3.
- 27.** Dacă scriem pe o tablă toate numerele naturale de la 1 la 100, apoi ștergem toți multiplii de 2 și toți multiplii de 3, aflați câte numere rămân scrise pe tablă.
- 28.** Ionel a ales dintr-o carte 7 foi și a adunat numerele înscrise pe cele 14 pagini ale foilor selectate. Este posibil ca suma obținută să fie 1428? (Bineînțeles, presupunem că Ionel nu greșește la adunare.)
- 29.** Un elev a dat un test cu 20 de probleme. Se știe că pentru fiecare problemă corect rezolvată se acordă 8 puncte, pentru fiecare problemă rezolvată greșit se scad 5 puncte, iar problemele nerezolvate se punctează cu zero. Aflați câte probleme a rezolvat corect elevul, știind că el a obținut 13 puncte la test.
- 30.** Într-un tramvai gol, în care încap cel mult 70 de pasageri, s-au urcat, la plecare,  $n$  pasageri ( $n \in \mathbb{N}^*$ ). Jumătate dintre ei au luat loc pe scaune. Aflați numărul  $n$ , știind că la prima stație 8% dintre pasageri au coborât din tramvai.

## TEMA 2. Numere întregi. Numere raționale

### Partea I

La fiecare dintre exercițiile de la 1 la 20 trebuie să efectuați calculele.

1.  $3 \cdot (-5) - (-12)$ .
2.  $(1 - 2 + 3 - 4) : 2$ .
3.  $(-45) : (3 - 8) + (-2) \cdot 2$ .
4.  $13 + 24 : (-2)$ .
5.  $25 : (-5) - (2 - 7)$ .
6.  $(-1)^4 + 2 \cdot (-1)^3$ .
7.  $(-2)^2 - (-2)^3 + 3^2$ .
8.  $2^8 : (-2)^6 - (-5)^0$ .
9.  $2 - (-3)^4 \cdot 3^5 : (-3)^7$ .
10.  $2,25 + 3,75 - 5$ .
11.  $4 \cdot 0,5 + 5 \cdot (-0,2)$ .
12.  $1,4 \cdot 1,5 - 4,1$ .
13.  $4,35 : 0,15 - 140 \cdot 0,2$ .
14.  $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{12}{5}$ .
15.  $\frac{1}{12} - \frac{5}{18} + \frac{1}{9}$ .
16.  $[0,5 + 0,3)] : \frac{5}{6}$ .
17.  $\left[1,1(6) - \frac{1}{6}\right] : (1,2)$ .
18.  $15 \cdot \left(0,5 - \frac{1}{6} + 0,6\right)$ .
19.  $\left[\left(\frac{2}{3}\right)^{-1} + \left(\frac{5}{2}\right)^{-1}\right] \cdot 10$ .
20.  $\left[2^{-2} - \left(-\frac{2}{3}\right)^{-2}\right] : (0,25)$ .
21. Calculați suma dintre opusul numărului întreg 2 și inversul numărului rațional  $-\frac{1}{3}$ .
22. Calculați produsul modulelor numerelor întregi  $-1, 2$  și  $-3$ .
23. Aflați toate numerele întregi care au valoarea absolută egală cu 12.
24. Scrieți toate numerele întregi impare cuprinse între  $-4$  și  $2$ .
25. Găsiți cel mai mare număr întreg mai mic decât  $-23,4$ .

# 80 DE VARIANTE DE SUBIECTE DUPĂ MODELUL M.E.N.

## TESTUL 11

**Subiectul I. Pe foaia de examen scrieți numai rezultatele. (30 puncte)**

- Rezultatul calculului  $20 - 10 : 5 + 5$  este egal cu ... .
- Dacă trei caiete costă 7,20 lei, atunci un caiet costă ... lei.
- Dacă  $\frac{x}{12} = \frac{5}{4}$ , atunci numărul  $3x - 40$  este egal cu ... .
- Un triunghi echilateral  $ABC$  are perimetrul egal cu 12,6 m. Lungimea laturii  $AB$  este egală cu ... m.
- În figura 1 este reprezentat un cub  $ABCDA'B'C'D'$  cu aria totală de  $96 \text{ cm}^2$ . Lungimea laturii  $AB$  este egală cu ... cm.
- În tabelul de mai jos sunt trecute rezultatele obținute în urma măsurării înălțimii fiecărui elev dintr-o clasă:




Figura 1

Înălțimea (în cm)	$\leq 150$	151-160	161-170	171-180	$\geq 180$
Număr de elevi	2	3	4	18	7

Numărul elevilor din clasă cu înălțimea mai mare de 1,60 m este egal cu ... .

**Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)**

- Desenați, pe foaia de examen, un con circular drept cu vârful  $V$ .
- Determinați elementele mulțimii  $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |2 + x| = 5\}$ .
- Bursa lunară a unui elev este mai mică decât 450 lei cu jumătate din valoarea ei. Aflați câți lei primește elevul ca bursă lunară.
- Se consideră funcția  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 2x - 3$ .
  - Determinați coordonatele punctelor de intersecție ale graficului funcției  $f$  cu axele  $Ox$  și  $Oy$  ale unui sistem de coordonate  $xOy$ .
  - Determinați coordonatele punctelor de pe graficul funcției  $f$  care se află la 3 unități distanță de originea sistemului de coordonate  $xOy$ .
- Fie  $E(x) = \frac{x}{x^3 + x^2} : \frac{(x+2)(2x-1)-x(x+3)+1}{(2x+2)(3x-3)}$ , unde  $x$  este număr real,  $x \neq -1$ ,  $x \neq 0$  și  $x \neq -\frac{1}{2}$ . Arătați că  $E(x) = \frac{6}{x(x+1)}$ , pentru orice  $x$  număr real,  $x \neq -1$ ,  $x \neq 0$  și  $x \neq -\frac{1}{2}$ .

**Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)**

1. În figura 2 este reprezentat un dreptunghi  $ABCD$ , cu  $AB = 60$  cm și  $BC = 50$  cm. Pătratele  $AEFG$  și  $CHIJ$  au laturile egale cu 10 cm.

- Aflați câți  $\text{cm}^2$  are aria suprafeței hașurate.
- Arătați că, dacă  $M$  este mijlocul segmentului  $AB$ , atunci dreptele  $FM$  și  $IM$  sunt perpendiculare.
- Arătați că dreptele  $EH$ ,  $FI$  și  $GJ$  sunt concurente.

2. În figura 3 este reprezentată o prismă patrulateră regulată  $ABCDA'B'C'D'$  cu latura bazei  $AB = 4$  m și muchia laterală  $AA' = 2\sqrt{2}$  m.

- Calculați volumul prismei (în  $\text{m}^3$ ).
- Determinați sinusul unghiului format de dreptele  $A'C$  și  $AD$ .
- Arătați că planele  $(A'BD)$  și  $(C'BD)$  sunt perpendiculare.




Figura 2




Figura 3

## TESTUL 12

**Subiectul I. Pe foaia de examen scrieți numai rezultatele. (30 puncte)**

- Rezultatul calculului  $-2^2 + 4 \cdot (-3)$  este egal cu ... .
- Dacă  $a = 250$ , atunci  $30\%$  din  $a$  este egal cu ... .
- Dintr-o clasă cu 12 băieți și 18 fete se alege, la întâmplare, un elev. Probabilitatea ca elevul ales să fie băiat este egală cu ... .
- Lungimea diagonalei unui pătrat cu perimetrul de 24 cm este egală cu ... cm.
- În figura 1 este reprezentat un cilindru circular drept cu raza bazei  $OA = 8$  cm și înălțimea  $OO' = 10$  cm. Aria laterală a cilindrului este de ...  $\pi$   $\text{cm}^2$ .
- Rezultatele elevilor unei clase la teza de matematică sunt reprezentate în graficul de mai jos. Numărul elevilor din clasă care au luat peste 7 este egal cu ... .





Figura 1



**Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)**

- Desenați, pe foaia de examen, un trunchi de piramidă patrulateră regulată  $ABCD'A'B'C'D'$ .
- Dacă  $x \in \mathbb{R}^*$ , astfel încât  $x + \frac{1}{x} = 4$ , aflați valoarea sumei  $x^2 + \frac{1}{x^2}$ .
- Aflați cel mai mic număr natural care împărțit la numerele 15, 30 și 45 dă, de fiecare dată, un cît diferit de zero și restul 13.
- Se consideră funcția  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x - 6$ .
  - Reprezentați grafic funcția  $f$  într-un sistem de coordonate  $xOy$ .
  - Calculați  $P = f(0) \cdot f(1) \cdot f(2) \cdot \dots \cdot f(99) \cdot f(100)$ .
- Se consideră expresia  $E(x) = \frac{(x^2 + 4x + 3)(x^2 + 3x + 2)}{x^2 + 5x + 6}$ , unde  $x$  este un număr real,  $x \neq -3$  și  $x \neq -2$ . Arătați că  $E(x) \geq 0$ , pentru orice  $x$  număr real,  $x \neq -3$  și  $x \neq -2$ .

**Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)**

- Triunghiul  $ABC$ , din figura 2, are  $m(\angle BAC) = 90^\circ$ ,  $AB = 30$  cm și  $AC = 40$  cm. Fie  $AQ \perp BC$ ,  $Q \in (BC)$  și  $M, N, P$  mijloacele laturilor  $BC, CA$ , respectiv  $AB$ .
  - Arătați că triunghiurile  $APN$  și  $QPN$  sunt congruente.
  - Calculați perimetrul patrulaterului  $MNPQ$  (în cm).
  - Demonstrați că punctele  $M, N, A, P, Q$  se află pe un cerc.




Figura 2

- În figura 3 este reprezentată o piramidă triunghiulară regulată  $ABCD$ , cu baza  $AB = 3$  m, apotema  $DM = 1$  m ( $M \in BC$ ) și înălțimea  $DO$ . Fie punctul  $V \in DO$  ( $D \in \in (VO)$ ) astfel încât  $VD = 9DO$ .
  - Arătați că  $DO = 0,5$  m.
  - Aflați lungimea segmentului  $VO$  (în m).
  - Calculați tangenta unghiului format de dreapta  $DA$  cu planul  $(ABC)$ .




Figura 3

## TESTUL 13

**Subiectul I. Pe foaia de examen scrieți numai rezultatele. (30 puncte)**

- Rezultatul calculului  $10 \cdot 0,23 + 1,7$  este egal cu ... .
- Dacă  $\frac{2}{x} = \frac{y}{7}$ , atunci numărul  $xy - 20$  este egal cu ... .