




Fluture coada-rândunicii negru



Ouăle
sunt
tăcute

de Dianna Hutts Aston și Sylvia Long




Ouăle sunt tăcute.



Stau acolo,

sub penele
mamei...



Colibrilul Annei

pe picioarele
tatălui
lor...



Pinguin imperial



Testoasa lui Kemp

sau îngropate
în nisip.

La căldură. Ferite.




Sturz Solitar
(*Myadestes townsendi*)



Frunzăriță cu crucele
(*Iridura caligata*)



Pântăruș de cactus
(*Campylorhynchus brunneicapillus*)



Potârnichă orientală
(*Alectoris chukar*)

Egretă azurie
(*Egretta caerulea*)


Sifancioc mare
(*Lanius excubitor*)

Vrăbie de pietris
(*Spizella passerina*)



Cuc american
(*Coccyzus americanus*)


Curcan



Cocor canadian
(*Ardea herodias*)



Gaiță lui Steller
(*Cyanocitta stelleri*)



Vrăbie lui Brewer
(*Spizella breweri*)

Grujizel cu cușmă neagră
(*Donacobius atricapilla*)



Pasărea-omătului
(*Plectrophenax nivalis*)



Fluturele-pasiunii
(*Agraulis vanillae*)



Pasărea-croitoare
(*Orthotomus sutorius*)




Tigănuș
(*Plegadis falcinellus*)



Ouăle sunt

Libris .RO

despre povesturi, jocuri și cărți




Ouăle au

Există ouă rotunde.



Testoasele marine sapă cu
înotătoarele lor o groapă în nisip,
unde depun până la 200 de ouă
moi și rotunde. Ouăle rotunde
încap mai bine în spații strâmte.


Există ouă ovale.



Când larva de buburuză
eclozează, primul lucru pe care
îl mănâncă este chiar coaja ouului
din care a ieșit.

nenumărate forme.

Există chiar și ouă tubulare.



Există ouă țuguiate.



Deși majoritatea rechinilor nasc pui vii, unii dintre ei – cum e rechinul-pisică – depun ouă pieloase, cu cărcei la capăt.

Cărceii prind ouăle de alge, ca să nu fie luate de curenții oceanului.

Ouăle păsărilor marine sunt țuguiate la un capăt, astfel încât, dacă sunt depuse pe marginea stâncilor, să se rotească în cercuri mici, nu să se rostogolească în gol.